

**Полтавський державний медичний університет
Кафедра дитячої стоматології**

**ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ
КАРІЄСУ ЗУБІВ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО
ШКІЛЬНОГО ВІКУ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ В
м. ПОЛТАВА**

**Виконавці: доцент Максименко А.І.,
професор Шешукова О.В.,
доцент Поліщук Т.В.**

Полтава - 2025

Актуальність теми



Актуальність теми



МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Вивчити та порівняти показники поширеності та інтенсивності карієсу зубів, гігієнічний стан порожнини рота у дітей молодшого шкільного віку (7-9 років), які навчаються у загальноосвітній школі I-III ступенів та у науковому ліцеї м. Полтави.




МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Для вивчення захворюваності на карієс проведено стоматологічне обстеження 350 дітей в віці 7-9 років, які проживають в м. Полтава. Як реєстраційний документ використовували комбіновані карти ВООЗ.

У всіх обстежених визначали наступні показники: поширеність (в %), інтенсивність (КПВ+кп) карієсу, потребування в санації, оцінювали стан гігієни порожнини рота (ГІ за Федоровим-Володкіною, 1971).


РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Загальноосвітня
школа



- Здорові
- Сановані
- Потребували санації


Науковий ліцей




- Здорові
- Сановані
- Потребували санації

Показники поширеності та інтенсивності карієсу


Поширеність карієсу
(В%)



Інтенсивність карієсу



ПІ за Федоровим-Володкіною (в балах)



Висновок

При порівнянні основних показників карієсу зубів у обстежених дітей 7-9 років двох шкіл м. Полтава, можна зробити висновок, що висока поширеність та інтенсивність карієсу, а також незадовільний стан гігієни порожнини рота у школярів загальноосвітньої школи в порівнянні з науковим ліцеєм, свідчить про недостатню ефективність лікувально-профілактичних заходів та санації порожнини рота.

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

