


**Буковинський державний медичний університет
Кафедра стоматології дитячого віку**

Годованець О.І., Муринюк Т.І.

**КЛІНІКО-РЕНТГЕНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ЩЕЛЕПНО ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ ДІТЕЙ, КОТРІ
ПОТРЕБУЮТЬ ВИДАЛЕННЯ ТРЕТЬОГО МОЛЯРА ЗА
ОРТОДОНТИЧНИМИ ПОКАЗАННЯМИ**





Актуальність



Ортодонтична патологія в дітей займає вагомe місце в структурі стоматологічної захворюваності дітей України.

(Данилюк ДВ, Чаповський АО, 2023; Фліс ПС, Іванова КВ, Дахно ЛО, 2021; Дорошенко СІ, Савонік СМ, 2020)

Одним із важливих питань в ортодонтії є тактика щодо третіх молярів, котрі залучаються до комплексного ортодонтичного лікування у переважній більшості випадків.

(Toedtling V, Devlin H, Tickle M, O'Malley L. , 2019; Prasad TS. , 2019; Duarte-Rodrigues L, Miranda EFP, Souza TO, de Paiva HN, Falci SGM, Galvao EL., 2018)

Операція видалення третього моляра є однією з найпоширеніших у практиці хірурга-стоматолога та викликає великий інтерес з точки зору практичної медицини


(Мар'ян-Йовбак ВЮ, Йовбак СВ, 2023; Su N, Harroui S, Rozema F, Listl S, de Lange J, van der Heijden GJMGV, 2023; Ткаченко ПІ, Гоголь АМ, Панькевич АІ, Колісник ІА, Доброскок ВО, 2019)




Кількість відвідувань на хірургічному етапі лікування ортодонтичних пацієнтів з урахуванням вікового чинника

Вік дитини	Кількість відвідувань			
	1	2	3	4
до 10 років (n=8)	12,50 % (n=1)	75,00 % (n=6)	0 % (n=0)	12,50 % (n=1)
11 років (n=34)	5,88 % (n=2)	70,59 % (n=24)	8,82 % (n=3)	14,71 % (n=5)
12 років (n=63)	6,35 % (n=4)	80,95 % (n=51)	4,76 % (n=3)	7,94 % (n=5)
13 років (n=95)	12,63 % (n=12)	83,16 % (n=79)	3,16 % (n=3)	1,05 % (n=1)
14 років (n=87)	22,99 % (n=20)	72,41 % (n=63)	2,30 % (n=2)	2,30 % (n=2)
15 років (n=71)	21,13 % (n=15)	71,83 % (n=51)	4,22 % (n=3)	2,82 % (n=2)
16 років (n=64)	21,88 % (n=14)	64,06 % (n=41)	4,69 % (n=3)	9,37 % (n=6)
17 років (n=40)	25,00 % (n=10)	55,00 % (n=22)	7,50 % (n=3)	12,50 % (n=5)
18 років (n=13)	53,85 % (n=7)	38,46 % (n=5)	0 % (n=0)	7,69 % (n=1)
разом(n=475)	17,89 % (n=85)	72,00 % (n=342)	4,21 % (n=20)	5,89 % (n=28)

Розподіл ортодонтичних пацієнтів за часом проведення операції видалення третіх молярів



Структура ортодонтичної патології в дітей груп спостереження



Клінічна характеристика післяопераційного періоду в дітей віком 11-13 років, котрим проведена операція видалення третіх молярів за ортодонтичними показаннями



**ДЯКУЮ
ЗА УВАГУ!**